

# **Psitacosis: La Fiebre del Loro**

2009-02-05 03:29:54



**La Psitacosis es también conocida como “la fiebre del loro” que suele suceder entre aves como palomas, pavos, gallinas, loros o canarios pero puede ser contagiada a un humano. Por lo general la contagian a los humanos los loros, ya que es muy común que esta ave sea utilizada de mascota, por ende conviven con humanos en los hogares.**

**Pero también se puede contagiar de esta enfermedad las personas que trabajan en mataderos de pollos y pavos o en veterinarias, ya que manipulan las aves y pueden inhalar los desechos de sus jaulas.**

**La bacteria Chlamydia psittaci es la causante de esta enfermedad. Los loros infectados, suelen tener esta enfermedad por diversas causas, como estar en contacto con bacterias, sometidos a un alto nivel de estrés o por estar con sus defensas inmunológicas bajas.**

**Estas situaciones se pueden dar todas a la misma vez cuando se contrabandean, ya que son transportadas por largos trayectos en terribles condiciones y hacinadas en espacios pequeños. Formando así una incubadora de bacterias y enfermedades en las que evoluciona esta patología.**

**El periodo de incubación de la Psitacosis varía de una a dos semanas y los síntomas que presenten las aves, dependen del tipo y edad de las mismas pero generalmente son faltas de apetito, deshidratación, diarrea, secreciones nasales y oculares y mala apariencia ya que su plumaje se arruga.**

**Si encontráramos estos síntomas, debemos llevar el ave a una consulta veterinaria , donde a través de una muestra de materia fecal se puede diagnosticar la enfermedad.**

**Aunque algunas aves mueren por esta enfermedad, se puede salvar con antibióticos recetados por el veterinario y en algunos casos, se puede salvar sin ser medicado.**

**Para evitar esta enfermedad, es necesario limpiar la jaula del ave de sus excrementos, para que no se sequen y puedan ser aspirados.**